

AJOVY (Fremanezumab)

Indikasjon: Migrene hos voksne med 4 anfall eller mer per måned

Refusjon: Individuell refusjon etter søknad av nevrolog eller barnelege til pasienter med diagnosen. Kronisk migrene som har forsøkt minst tre andre forebyggende medikamenter uten effekt eller med bivirkninger.

BRUKSOMRÅDER OG EFFEKTER

Vanlige bruksområder	Effekter
Forebyggende behandling av migrene.	Ajovy er et monoklonalt antistoff som fungerer ved å binde seg til CGRP reseptoren. Vi vet at CGRP øker under et migreaneanfall. Ajovy hemmer den biologiske effekten av CGRP og dermed også smerten ved migrene, sannsynligvis ved modulering av trigeminus systemet.

BIVIRKNINGER

Tabellen angir et utvalg vanlige eller alvorlige bivirkninger, og indikerer når bivirkningene vanligvis inntreer og hvordan de kan håndteres. For mer informasjon om bivirkninger, se SPC og Legemiddelhåndboka.

Bivirkning	Inntreer	Egenomsorg	Lege	Kommentar
Smerte, hard hud og rødhet på injeksjonsstedet	Innen et par dager etter injeksjon		●	Milde og oftest forbigående
Kløe på injeksjonsstedet	Når som helst under behandling		●	Milde og oftest forbigående

Symbolforklaring:

- Behov for legekontakt vurderes ut ifra alvorlighetsgrad
- ▲ Pasienten bør kontakte lege for vurdering
- ▲! Kontakt lege umiddelbart, Ring 113

PRAKTISK BRUK

	Injeksjon
Inntak Tidspunkt og mat	To doseringsalternativer: - Månedlig dosering: 225 mg 1 gang i måneden - Kvartalsvis dosering: 675 mg hver 3. måned. Se SPC ved bytte av doseringsregime.
Administrering	<ul style="list-style-type: none">- Sprit av huden før injisering.- Hele innholdet skal injiseres i underhuden i magen, låret eller i overarmen, se pakningsvedlegget.- Injeksjonsstedene skal byttes på, og skal ikke settes i områder hvor huden er øm, har blåmerker, er rød eller hard.- Etter opplæring kan pasienten selv administrere ved å følge bruksanvisningen.- Kast sprøyten i en gul kanylebøtte eller på annen forsvarlig måte.
Glemt dose	Behandlingen gjenopptas så snart som mulig med indisert dose og regime. Det skal ikke gis dobbel dose som erstatning for uteblitt dose.
Andre råd	<ul style="list-style-type: none">- Til engangsbruk- Skal ikke ristes- Oppbevares i kjøleskap i 2-8 grader Celsius- Bør være i romtemperatur minst 30 min før injisering- Beskyttes mot direkte sollys- Sjekkes visuelt før bruk. Skal ikke injiseres hvis uklar, tydelig gul eller inneholder flak eller partikler.- Tilby abonnement

INTERAKSJONER

Det er ingen kjente interaksjoner med Ajoyv og måten Ajoyv virker i kroppen gjør det lite sannsynlig med interaksjoner.