

AIMOVIG (Erenumab)

Indikasjon: Migrene hos voksne med 4 anfall eller mer per måned

Refusjon: Individuell refusjon etter søknad av nevrolog eller barnelege til pasienter med diagnosen Kronisk migrene som har forsøkt minst tre andre forebyggende medikamenter uten effekt eller med bivirkninger.

BRUKSOMRÅDER OG EFFEKTER

Vanlige bruksområder	Effekter
Forebyggende behandling av migrene	Aimovig er et monoklonalt antistoff som fungerer ved å binde seg til CGRP reseptoren. Vi vet at CGRP øker under et migreaneanfall. Aimovig hemmer den biologiske effekten av CGRP og dermed også smerten ved migrene, sannsynligvis ved modulering av trigeminus systemet.

BIVIRKNINGER

Tabellen angir et utvalg vanlige eller alvorlige bivirkninger, og indikerer når bivirkningene vanligvis inntreer og hvordan de kan håndteres. For mer informasjon om bivirkninger, se SPC og Legemiddelhandboka.

Enkelte av symptomene som er rapportert som bivirkninger kan være en del av selve migreaneanfallet.

Bivirkning	Inntreer	Egenomsorg	Lege	Kommentar
Forstoppelse	Når som helst under behandling	Lindring/forebygging: Ikke-medikamentelle tiltak, volumøkende midler, osmotisk virkende midler, sennaglykosider, klyster	●	
Reaksjoner på injeksjonsstedet	Innen et par dager etter injeksjon		●	Milde og oftest forbigående
Kløe på injeksjonsstedet eller i huden	Når som helst under behandling		●	Obs latex allergi! Latex i korken på injeksjonspennen
Overfølsomhetsreaksjoner (inkl. anafylaktisk reaksjon, angioødem, utslett, hevelse/ødem og urticaria)	Når som helst under behandling		●	Obs latex allergi! Latex i korken på injeksjonspennen
Muskelkramper	Når som helst under behandling		●	

Symbolforklaring:

● Behov for legekontakt vurderes ut ifra alvorlighetsgrad

▲ Pasienten bør kontakte lege for vurdering

⚠ Kontakt lege umiddelbart, Ring 113

Aimovig er på den europeiske overvåkingslisten fordi man trenger mer informasjon om bivirkninger. Det betyr at alle mistenkte bivirkninger skal meldes inn. Meldeskjema ligger på <https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet>

PRAKTISK BRUK

	Injeksjon
Inntak Tidspunkt og mat	Én dose hver 4. uke (70mg eller 140mg) til selvinjeksjon etter opplæring
Administrering	<ul style="list-style-type: none">- Sprit av huden før injisering.- ele innholdet skal injiseres i underhuden i magen, låret eller i ytre del av overarmen, se pakningsvedlegget.- Injeksjonsstedene skal byttes på, og skal ikke settes i områder hvor huden er øm, har blåmerker, er rød eller hard.- Etter opplæring kan pasienten selv administrere ved å følge bruksanvisningen.- Kast sprøyten i en gul kanylebøtte eller på annen forsvarlig måte.
Glemt dose	Pasienten bør rådes til å injisere glemt dose så snart som mulig, og deretter kontakt lege.
Andre råd	<ul style="list-style-type: none">- Til engangsbruk- Mål ikke ristes- Oppbevares i kjøleskap i 2-8 grader Celsius- Bør være i romtemperatur minst 30 min før injisering- Kan oppbevares i inntil 25 grader Celsius i en enkelt periode på inntil 14 dager- Skal destrueres om den har vært i ute av kjøleskap >14 dager- Beskyttes i original emballasjen mot direkte sollys- Sjekkes visuelt før bruk. Skal ikke injiseres hvis uklar, tydelig gul eller inneholder flak eller partikler.- Tilby abonnement

INTERAKSJONER

Det er ingen kjente interaksjoner med Aimovig og måten Aimovig virker i kroppen gjør det lite sannsynlig med interaksjoner.