



## Refusjonslisten 01.12.08 - utdrag for psykiatrien

Refusjonskoder for psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser:

ICPC	ICD	
-70	-70	Betydelige atferdsproblemer som krever behandling
-72	F2	Behandlingskrevende psykotiske eller psykosenære symptomer ved psykisk lidelse
-73	F3	Behandlingskrevende forstyrrelse i stemningsleie ved psykisk lidelse
-74	F4	Behandlingskrevende angstsymptomer ved psykisk lidelse

Tabellen er sortert alfabetisk på legemidlets handelsnavn. Generisk legemiddel er oppført der dette finnes. Vilkår i fulltekst er listet til slutt.

Handelsnavn	Virkestoff	Refusjonsberettiget bruk	Refusjonskoder		Vilkår
			ICPC	ICD	
Abilify	aripirazol	Schizofreni.	-72	F2	45
Akineton <sup>1)</sup>	biperiden	Medikamentelt betingede ekstrapyramidale symptomer (akutt dystoni og dyskinesi)	N87	G21	<b>83</b>
Anafranil <sup>1)</sup> Klomipramin <sup>1)</sup>	klomipramin	Depresjoner. Tvangslidelse (OCD). Panikklidelse.	-73 -74	F3 F4	-
Aurorix Moclobemid	moklobemid	Depresjoner.	-73	F3	-
Buspar Buspiron	buspiron	Behandling av generalisert angs lidelse.	-74	F4	45
Buspiron	buspiron	<i>Se Buspar</i>			
Cipralex	escitalopram	Depresjoner. Panikklidelse med eller uten agorafobi. Sosiale fobier.	-73 -74	F3 F4	-
Cipramil Citalopram	citalopram	Depresjoner. Panikklidelse med eller uten agorafobi. Tvangslidelse (OCD).	-73 -74	F3 F4	-
Cisordinol	zuklopentixol	Psykotiske lidelser. Mani. Konfusjons- og urotilstander hos demente. Uro og atferdsforstyrrelser hos utviklingshemmede.	-70 -72 -73	-70 F2 F3	45
Cisordinol Depot	zuklopentixol	Psykotiske lidelser.	-72	F2	45
Citalopram	citalopram	<i>Se Cipramil</i>			
Clozapin	klozapin	<i>Se Leponex</i>			
Concerta	metylfenidat	Hyperkinetisk forstyrrelse (ADHD) hos barn og ungdom (fra 6 til om med 17 år) som del av et behandlingsopplegg når støttetiltak alene ikke er tilstrekkelig.	P81	F90	<b>148</b>
Deprakine <sup>1)</sup>	valproinsyre	<i>Se Orfiril</i>			
Edronax	reboxetin	Depresjoner.	-73	F3	-
Efexor Venlix	venlafaxin	Depresjoner.	-73	F3	-
Efexor Depot Venlafaxin	venlafaxin	Depresjoner. Generalisert angstlidelse (GAD).	-73 -74	F3 F4	-
Equasym Depot	metylfenidat	Behandling av hyperkinetisk forstyrrelse (ADHD) hos barn og ungdom (fra 6 til og med 17 år) som del av et behandlingsopplegg når støttetiltak alene ikke er tilstrekkelig.	P81	F90	-
Equasym tablett <sup>1)</sup>	metylfenidat	Hyperkinetisk forstyrrelse hos barn og ungdom (6-17 år) og residual ADHD hos voksne. Refusjon omfatter kun behandling som del av et behandlingsprogram når støttetiltak alene ikke er tilstrekkelig.	P81	F90	-
Fevarin	fluvoxamin	Depresjoner. Tvangslidelse (OCD).	-73 -74	F3 F4	-
Fluanxol	flupentixol	Psykotiske lidelser. Mani. Atferdsforstyrrelser hos demente. Atferdsforstyrrelser hos utviklingshemmede.	-70 -72 -73	-70 F2 F3	45
Fluanxol Depot	flupentixol	Langtidsbehandling av psykotiske lidelser.	-72	F2	45

Handelsnavn	Virkestoff	Refusjonsberettiget bruk	Refusjonskoder		Vilkår
			ICPC	ICD	
Fluoxetin	fluoxetin	<i>Se Fontex</i>			
Fontex Fluoxetin	fluoxetin	Depresjoner. Tvangslidelse (OCD). Bulimia nervosa: som supplement ved samtidig psykoterapi.	-70 -73 -74	-70 F3 F4	-
Haldol Depot	haloperidol	Kroniske psykotiske lidelser.	-72	F2	45
Haldol <sup>1)</sup>	haloperidol	Psykotiske lidelser. Psykomotorisk uro, spesielt maniske, aggressive og forvirrede pasienter. Atferdsforstyrrelser hos demente.	-70 -72 -73	-70 F2 F3	45
Karbamazepin <sup>1)</sup>	karbamazepin	<i>Se Tegretol</i>			
Klomipramin <sup>1)</sup>	klomipramin	<i>Se Anafranil</i>			
Lamictal <sup>1)</sup> Lamotrigin <sup>1)</sup>	lamotrigin	Profylaktisk behandling av bipolar affektiv lidelse, hovedsakelig ved å forebygge depressive episoder.	-73	F3	45
Lamotrigin <sup>1)</sup>	lamotrigin	<i>Se Lamictal</i>			
Leponex Clozapin	klozapin	Behandlingsresistent schizofreni, og for schizofrene pasienter som ved bruk av andre antipsykotika, inkludert et atypisk antipsykotikum, har fått alvorlige neurologiske bivirkninger som ikke lar seg behandle. Behandlingsresistens defineres som mangel på tilfredsstillende klinisk forbedring til tross for bruk av adekvate doser av minst to antipsykotika, inkludert et atypisk antipsykotikum, forskrevet i tilstrekkelig lang tid. Psykotiske lidelser som oppstår ved Parkinsons sykdom, i tilfeller der standardbehandling har sviktet.	-72	F2	<b>46</b>
Lithionit	litium	Profylaktisk ved maniske og depressive faser i bipolar affektiv lidelse. Terapeutisk ved maniske tilstander.	-73	F3	45
Medikinet	metylfenidat	Behandling av hyperkinetisk forstyrrelse (ADHD) hos barn og ungdom (fra 6 til og med 17 år) som del av et behandlingsopplegg når støttetiltak alene ikke er tilstrekkelig.	P81	F90	-
Mianserin	mianserin	<i>Se Tolvon</i>			
Mirtazapin	mirtazapin	<i>Se Remeron</i>			
Mirtin	mirtazapin	<i>Se Remeron</i>			
Moclobemid	moklobemid	<i>Se Aurorix</i>			
Noritren <sup>1)</sup>	nortriptylin	Depresjoner.	-73	F3	-
Nozinan <sup>1)</sup>	levo-mepromazin	Psykotiske lidelser preget av eksitasjon, uro, angst, spenning og irritabilitet.	-72 -74	F2 F4	45
Olanzapin	olanzapin	<i>Se Zyprexa</i>			
Orfiril <sup>1)</sup> Deprakine <sup>1)</sup> Orfiril Long <sup>1)</sup> Orfiril Retard <sup>1)</sup>	valproinsyre	Behandling av akutt manisk episode og profylaktisk behandling av bipolar affektiv lidelse når litium ikke har effekt eller tolereres.	-73	F3	45
Paroxetin	paroxetin	<i>Se Seraxat</i>			
Quetiapin	quetiapin	<i>Se Seroquel</i>			
Racemisk Amfetamin NAF <sup>1)</sup>	amfetamin	Hyperkinetisk forstyrrelse (ADHD).	P81	F90	-
Remeron Remeron-S Mirtazapin Mirtin	mirtazapin	Depresjoner.	-73	F3	-

Handelsnavn	Virkestoff	Refusjonsberettiget bruk	Refusjonskoder		Vilkår
			ICPC	ICD	
Risperdal Risperidon	risperidon	Akutte og kroniske schizofrene psykoser. Mani ved bipolare lidelser. Alvorlige adferdsforstyrrelser hos pasienter med demens hvor aggresjon, agitasjon eller psykotiske symptomer er uttalte og fører til økt lidelse, økt grad av invaliditet for pasienten eller at pasienten representerer en fare for seg selv eller andre. Betydelig adferdsforstyrrelser hos barn, unge og voksne med mild til moderat alvorlig psykisk utviklingshemming, hvor destruktiv adferd (f.eks. aggresjon, impulsivitet og selvbeskadigelse) er framtreddende.	-70 -72 -73	-70 F2 F3	45
Risperdal Consta	risperidon	Schizofrene psykoser.	-72	F2	45
Risperidon	risperidon	<i>Se Risperdal</i>			
Ritalin kapsel m/mod.frisetting	metylfenidat	Hyperkinetisk forstyrrelse hos barn og ungdom (6-17 år). Residual ADHD hos voksne. Refusjon omfatter kun behandling som del av et behandlingsprogram når støttetiltak alene ikke er tilstrekkelig.	P81	F90	<b>100</b>
Ritalin tablett <sup>1)</sup>	metylfenidat	Hyperkinetisk forstyrrelse hos barn og ungdom (6-17 år) og residual ADHD hos voksne. Refusjon omfatter kun behandling som del av et behandlingsprogram når støttetiltak alene ikke er tilstrekkelig.	P81	F90	-
Sarotex <sup>1)</sup> Sarotex Retard <sup>1)</sup>	amitriptylin	Depresjoner.	-73	F3	-
Serdolect	sertindol	Schizofreni.	-72	F2	45
Seroquel Quetiapin	quetiapin	Schizofreni. Behandling av moderate til alvorlige maniske episoder.	-72 -73	F2 F3	45
Seroxat Paroxetin	paroxetin	Depresjoner. Tvangslidelse (OCD). Panikklidelse med og uten agorafobi. Sosiale fobier. Generalisert angstlidelse (GAD).	-73 -74	F3 F4	-
Sertralin	sertralin	<i>Se Zolof</i>			
Sinequan	doxepin	Depresjoner.	-73	F3	-
Solian	amisulprid	Schizofreni.	-72	F2	45
Stemetil <sup>1)</sup>	proklorperazin	Schizofreni. Angstlidelser.	-72 -74	F2 F4	45
Strattera	atomoksetin	Hyperkinetisk forstyrrelse hos barn og eldre ungdom (6-17 år) som del av et omfattende behandlingsprogram. Behandlingen skal startes av lege med relevant kompetanse og erfaring i behandling av ADHD. Diagnosen bør stilles i henhold til DSM-IV kriterier eller ICD-10 retningslinjer.	P81	F90	<b>144</b>
Surmontil	trimipramin	Depresjoner.	-73	F3	-
Tegretol <sup>1)</sup> Karbamazepin <sup>1)</sup> Tegretol Retard <sup>1)</sup> Trimonil Retard <sup>1)</sup>	karbamazepin	Behandling av akutt manisk episode. Profylaktisk behandling av bipolar affektiv lidelse.	-73	F3	45
Tolvon Mianserin	mianserin	Depresjoner.	-73	F3	-
Trilafon Dekanoat	perfenazin	Psykotiske lidelser.	-72	F2	45
Trilafon <sup>1)</sup>	perfenazin	Psykotiske lidelser. Angstlidelser. Uro hos demente.	-70 -72 -73 -74	-70 F2 F3 F4	45
Trimonil Retard <sup>1)</sup>	karbamazepin	<i>Se Tegretol</i>			
Truxal	klorprotixen	Psykotiske lidelser. Angstlidelser.	-72 -74	F2 F4	45

Handelsnavn	Virkestoff	Refusjonsberettiget bruk	Refusjonskoder		Vilkår
			ICPC	ICD	
Venlafaxin (depot)	venlafaxin	Se <i>Efexor Depot</i>			
Venlix	venlafaxin	Se <i>Efexor</i>			
Wellbutrin Retard	bupropion	Depresjoner.	-73	F3	142
Zalasta	olanzapin	Se <i>Zyprexa</i>			
Zeldox (injeksjon)	ziprasidon	Akutt kontroll av agitasjon hos pasienter med schizofreni når oral terapi ikke er hensiktsmessig, i maksimum 3 påfølgende dager.	-72	F2	45
Zeldox (kapsler)	ziprasidon	Schizofreni.	-72	F2	45
Zoloft Sertralin	sertralin	Depresjoner. Tvangslidelse (OCD). Panikklidelse med eller uten agorafobi.	-73 -74	F3 F4	-
Zyprexa Zyprexa Velotab Olanzapin Zalasta	olanzapin	Schizofreni. Moderat til alvorlig manisk episode. Forebygging av nye episoder hos pasienter med bipolar affektiv lidelse, som har respondert på olanzapinbehandling i manisk fase.	-72 -73	F2 F3	45

1) Legemidlet har forhåndsgodkjent refusjon for flere bruksområder enn de som er nevnt her. Tabellen viser kun forhåndsgodkjent refusjon for psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser.

### Vilkår:

- 45 Behandlingen bør være instituert i psykiatrisk sykehus, avdeling eller poliklinikk eller av spesialist i psykiatri, og for den videre forskrivning bør det foreligge erklæring fra slik instans om det er indisert å fortsette behandlingen ambulant.
- 
- 46 Behandlingen skal være instituert av spesialist i psykiatri, og for den videre forskrivning bør det foreligge erklæring fra slik instans om det er indisert å fortsette behandlingen ambulant.
- 
- 83 Ved medikamentell parkinsonisme bør behandlingen være instituert i psykiatrisk sykehus, avdeling eller poliklinikk eller av spesialist i psykiatri, og for den videre forskrivning bør det foreligge erklæring fra slik instans om det er indisert å fortsette behandlingen ambulant.
- 
- 100 For voksne som har påbegynt behandling etter fylte 18 år, er det i tillegg et krav at Ritalin tabletter skal være forsøkt først, med uakseptable bivirkninger eller ikke tilstrekkelig effekt eller erfaring med pasientens manglende compliance tilsier at Ritalin tabletter ikke kan benyttes. - Begrunnelse for bruk av Ritalin kapsler med modifisert frisetting skal dokumenteres i journal.
- 
- 142 Refusjon ytes kun til pasienter som har forsøkt både SSRI og SNRI med utilstrekkelig effekt og/eller uakseptable bivirkninger. Dette må begrunnes i journalen. 300 mg er ikke vist å ha bedre virkning enn 150 mg og har derfor ikke forhåndsgodkjent refusjon.
- 
- 144 -Refusjon ytes kun til barn og ungdom i aldersgruppen 6-17 år der tungtveiende medisinske grunner tilsier at metylfenidat ikke kan benyttes. Dette skal dokumenteres i journal. - Forskrivning kan kun foretas i samråd med spesialist i barnesykdommer, barne- og ungdomspsykiatri, psykiatri, nevrologi, eller sykehusavdeling med tilsvarende spesialitet. Navn på spesialist/sykehusavdeling skal dokumenteres i journal. -Effekten av behandlingen skal kontrolleres og dokumenteres i journal minst en gang per år så lenge behandlingen pågår. Ved mistanke om manglende effekt skal prøveseponering gjennomføres.
- 
- 148 -Ved oppstart av behandling med langtidsvirkende metylfenidat, skal enten Equasym depot, Medikinet depotkapsel eller Ritalin kapsel med modifisert frisetting forsøkes først, og Concerta kan kun forskrives når pasienten ikke oppnår tilstrekkelig langtidsvirkende effekt med det forsøkte preparatet. - Concerta kan forskrives som 1.valg til barn og ungdom dersom tungtveiende medisinske grunner tilsier at Equasym depot, Medikinet depotkapsel eller Ritalin kapsler med modifisert frisetting ikke kan benyttes. Begrunnelse for bruk av Concerta skal dokumenteres i journal.

Ved spørsmål om refusjonslisten, ta kontakt med Statens legemiddelverk på telefon 22 89 77 00 eller e-post [blaarev@legemiddelverket.no](mailto:blaarev@legemiddelverket.no)